

Brunstsynkronisering

Når vi ønsker en koncentration af læmninger, kan det være en god ide at benytte sig af "væddereffekten". Det er tilstedeværelsen af duftstoffer som seksuelt aktive væddere udskiller fra deres talg og svedkirtler i huden. Det påvirker fårene, når de nærmer sig brunstsæsonen. Når fårene må hverken kunne se eller lugte vædderne i mindst 3 uger, får de fleste får en stille ægløsning indenfor 3-4 dage efter vædderintroduktionen.

Dertil kan med godt resultat gøre brug af en steriliseret vædder, en "teaservædder". Det er en voksen vædder, der ikke skal bruges til avl mere. Vædderen skal have en god libido for at påvirke fårene bedst muligt. Derfor bør man ikke benytte vædderlam, der ikke rigtigt er blevet til noget. En teaservædder kan bruges i flere år, så udgiften til sterilisationen er ikke så stor – på lang sigt.

40-60% af flokken vil komme i brunst omkring 18-26 dage efter opstart.

Hvordan får jeg succes

- Fårene må ikke kunne se eller lugte vædderne i mindst 3 uger før introduktion af teaservædderen
- Teaservædderen lukkes ind til fårene i mindst 2-3 dage og højst 14 dage
- Brug 2 teaservæddere pr 100 får
- To toppe af synkroniseret brunst vil vise sig mellem 18 og 26 dage efter teaservædderen er sat til
- Et stort antal bedækningsdygtige væddere sættes til på dag 14 (en vædder pr 25-30 får)

Brug af vædder

Har man ikke en teaservædder, men gerne vil afprøve systemet, kan man lukke vædderen til i 2 dage – tage den ud i 12 dage og derefter lukke den til igen. Det vil give mulighed for lidt lam ca 3 uger før boomet kommer.